

	Mode Opérateur	
	PO05-MO0002	I.E. :1
	Mode opératoire de prélèvement	

Détails du document			
Mat. Superviseur	Superviseur	Site	Activité
000031	Lauriane Marie LE FLOUR		Actes

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	11/06/2019	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Abdoulaye Diop	Directeur Médical et Technique		11/06/2019	00:00:00

Liste des vérificateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		11/06/2019	00:00:00

Liste des approbateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Khadidiatou NAKOULIMA	Présidente		11/06/2019	00:00:00

Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions relatives au prélèvement du matériel biologique pour analyse.

Domaine d'application

Ce mode opératoire s'applique à l'ensemble des personnes responsables du prélèvement du matériel biologique.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de cette procédure.

Référence

Norme ISO 9001 V 2015

Description du mode opératoire

Le garrot posé pour permettre la pénétration de l'aiguille doit être enlevé avant de commencer le prélèvement. Le sang prélevé doit être mis au frais (entre 2°C et 6°C) immédiatement après le prélèvement. À température ambiante la durée de conservation maximale est de 30 minutes.

Dénomination des tubes

Tube sec	Tube Citraté	Tube Hépariné	Tube EDTA	Tube Fluoré
				
- Biochimie - Sérologie - Hormonologie - Electrophorèse des protéines - Immunoélectrophorèse - Troponine - Marqueurs tumoraux	- TP-TCA - Fibrinogène - D Dimère - Autres paramètres de l'hémostase - NFS	- Biochimie - T E - Electrophorèse hémoglobine - HbA1C	- NFS - GS-RH - GE-QBC - VS - TE - Electrophorèse hémoglobine - RAI - HbA1C	Glycémie (prélèvement extérieur)

Ecouvillon 	Pot ECBU 	Pot KOP + Coproculture 
--	--	--

- PUS
- Prélèvement vaginal
- Prélèvement urétral
- Prélèvement mycologie
- Prélèvement gorge

- E C B U
- Protéinurie (échantillon)
- Glucosurie (échantillon)

- KOP
- Coproculture

Choix des tubes et ordre des prélèvements

Tube sec		Bouchon rouge
Tube Citraté		Bouchon bleu
Tube Hépariné		Bouchon vert
Tube EDTA		Bouchon violet
Tube Fluoré		Bouchon gris