

	Mode Opérateur	
	PS06-MO0001 Mode opératoire du lavage des mains	I.E. :2

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	21/08/2017	Création
2	21/10/2019	Importation Qualipro

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Florence SAMBOU	Infirmière Responsable Nursérie		25/11/2021	14:59:47

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage- femme		03/12/2021	11:58:17

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		03/12/2021	12:09:46

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de lavage des mains. Il vise à assurer que l'ensemble du personnel médical et paramédical assure pour lui et le patient la meilleure sécurité possible contre la contamination.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'ensemble des structures NEST.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

Prérequis :

- Tenue à manches courtes
- Ongles courts sans dépôts (1mm ou moins), ongles nus (absence de vernis, faux ongles...)
- Aucun bijou (ni alliance, ni montre...)
- Mains sèches et macroscopiquement propres

Lavage simple

Qui ?

Tout le personnel :

- Médical
- Paramédical

Quand ?

- A la prise et au départ du service
- Lorsque les mains sont visiblement sales ou souillées par du sang ou d'autres liquides biologiques, ou après être allé aux toilettes
- Dans des situations spécifiques : prise en charge de patients porteurs de certains agents pathogènes (*Clostridium difficile*, gale : lavage simple recommandé suivi d'une FHA)
- Avant de manipuler des médicaments ou de préparer des aliments
- Après le retrait de gants poudrés

Action	Illustration
1) Mouiller mains et poignets	
2) Prendre une dose de savon doux (1 seule suffit)	

3) Frotter 15 secondes minimum (action mécanique), insister sur les espaces interdigitaux	
4) Rincer abondamment (temps de rinçage équivalent au temps de savonnage)	
5) Sécher par tamponnement avec un premier essuie-mains à usage unique. Fermer le robinet avec l'essuie mains (si commande manuelle). Terminer le séchage avec un second essuie-mains. Jeter l'essuie-mains dans la poubelle sans la toucher avec la main	

Friction hydroalcoolique

Qui ?

Tout le personnel :

- Médical
- Paramédical

Quand ?

Si les mains ne sont pas visiblement souillées (sinon laver à l'eau) :

- Avant et après avoir touché un patient
- Avant de manipuler un dispositif médical invasif pour les soins au patient, indépendamment de l'usage des gants
- Après avoir touché des liquides biologiques, des excréments, des muqueuses, une peau lésée ou un pansement
- En passant d'un site corporel contaminé à un autre site corporel au cours de soins à un même patient
- Après avoir touché des surfaces et des objets inanimés (équipement médical inclus) à proximité immédiate du patient
- Avant le port de gants pour un soin
- Après avoir retiré des gants stériles ou non stériles

Lorsqu'aucun produit hydroalcoolique n'est disponible, se laver les mains au savon et à l'eau.

- Avant de manipuler des médicaments ou de préparer des aliments (lavage à l'eau ou par friction hydroalcooliques sachant que les savons et les produits hydroalcooliques ne doivent pas être utilisés simultanément)

Action	Illustration
1) Prendre le volume nécessaire pour couvrir complètement les mains et les poignets (1,5 à 3 ml selon les recommandations du fabricant du produit utilisé et la taille des mains)	
2) Frictionner paume contre paume	

3) Paume main droite sur dos de la main gauche et vice versa	
4) Paume contre paume doigts entrelacés	
5) Dos des doigts contre la paume opposée avec doigts emboîtés	
6) Friction circulaire des pouces enchâssés dans la paume opposée	
7) Friction par rotation des doigts joints dans la paume opposée	

8) Friction des poignets



Désinfection chirurgicale


Qui ?

- Personnel médical et de bloc

Quand ?

AVANT **TOUT** ACTE chirurgical et d'obstétrique

Etape	Action	Commentaire
Lavage simple	1) Mouiller les mains, les avant-bras et coudes inclus (lors de la désinfection, les coudes sont inclus) et prendre 1 dose de savon doux	
	2) Savonner les mains, les avant-bras et les coudes durant au moins 15 secondes	
	3) Au premier lavage de la journée , brosser les ongles : 15 secondes pour chaque main	

	4) Rincer abondamment sous l'eau du réseau en assurant une action mécanique : 60 secondes	
	5) Sécher soigneusement les mains, les avant-bras et les coudes avec un essuie-mains non stérile. Jeter l'essuie mains dans la poubelle	
Désinfection chirurgicale en 2 frictions	1) 1^{ère} friction : - Prendre une quantité suffisante de PHA (produit hydroalcoolique) - Etaler le produit des mains jusqu'aux coudes inclus - Frictionner pendant le temps recommandé en fonction du produit utilisé	
	2) 2^e friction : - Reprendre une quantité suffisante de PHA (produit hydroalcoolique) - Etaler le produit des mains jusqu'aux avant-bras - Frictionner les mains et les avant-bras, coudes exclus pendant le temps recommandé en fonction du produit utilisé, jusqu'à séchage complet avant d'enfiler les gants	